

Groupes

Morphismes de groupes

Exercice 1 [02218] [Correction]

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^n$.

Montrer que f est un morphisme du groupe (\mathbb{R}^*, \times) dans lui-même.

En déterminer image et noyau.

Exercice 2 [02219] [Correction]

Justifier que $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ vers (\mathbb{C}^*, \times) .

En déterminer image et noyau.

Exercice 3 [02221] [Correction]

Soit $(G, *)$, (G', \top) deux groupes et $f: G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

- Montrer que pour tout sous-groupe H de G , $f(H)$ est un sous-groupe de (G', \top) .
- Montrer que pour tout sous-groupe H' de G' , $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

Exercice 4 [02222] [Correction]

On note $\text{Aut}(G)$ l'ensemble des isomorphismes d'un groupe $(G, *)$ dans lui-même.

Montrer que $\text{Aut}(G)$ est un sous-groupe du groupe des permutations (\mathcal{S}_G, \circ) .

Exercice 5 [02223] [Correction]

Soit $(G, *)$ un groupe et $a \in G$.

On définit une loi de composition interne \top sur G par $x \top y = x * a * y$.

- Montrer que (G, \top) est un groupe.
- Soit H un sous groupe de $(G, *)$ et $K = \text{sym}(a) * H = \{\text{sym}(a) * x \mid x \in H\}$.
Montrer que K est un sous groupe de (G, \top) .
- Montrer que $f: x \mapsto x * \text{sym}(a)$ est un isomorphisme de $(G, *)$ vers (G, \top) .

Exercice 6 [00119] [Correction]

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Déterminer les morphismes du groupe (\mathcal{S}_n, \circ) vers (\mathbb{C}^*, \times) .

Sous-groupes

Exercice 7 [00113] [Correction]

Un sous-groupe d'un groupe produit est-il nécessairement produit de deux sous-groupes ?

Exercice 8 [00114] [Correction]

Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe $(G, *)$.

À quelle condition l'ensemble $H \cup K$ est-il un sous-groupe de $(G, *)$?

Exercice 9 [03432] [Correction]

Un sous-groupe H de $(G, .)$ est dit distingué si

$$\forall x \in H, \forall a \in G, axa^{-1} \in H.$$

- Montrer que le noyau d'un morphisme de groupes au départ de $(G, .)$ est distingué.
- Soient H, K deux sous-groupes de $(G, .)$.
On suppose le sous-groupe H distingué, montrer que l'ensemble

$$HK = \{xy \mid x \in H, y \in K\}$$

est un sous-groupe de $(G, .)$.

Exercice 10 [02366] [Correction]

Montrer que

$$\{x + y\sqrt{3} \mid x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$$

est un sous-groupe de (\mathbb{R}_+, \times) .

Exercice 11 [02648] [Correction]

Soit G un groupe, H un sous-groupe de G , A une partie non vide de G . On pose $AH = \{ah \mid a \in A, h \in H\}$. Montrer que $AH = H$ si, et seulement si, $A \subset H$.

Exercice 12 [02948] [Correction]

- Montrer que tout sous-groupe additif de \mathbb{R} qui n'est pas monogène est dense dans \mathbb{R} .

(b) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe une infinité de $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

(c) Montrer la divergence de la suite de terme général

$$u_n = \frac{1}{n \sin n}.$$

Éléments d'ordre fini

Exercice 13 [03453] [Correction]

Soit (G, \cdot) un groupe de cardinal $2n$.

(a) Justifier que l'on définit une relation d'équivalence \mathcal{R} sur G en posant

$$x\mathcal{R}y \iff x = y \text{ ou } x = y^{-1}.$$

(b) En déduire l'existence dans G d'un élément d'ordre 2.

Exercice 14 [00116] [Correction]

Soient $(G, *)$ un groupe fini commutatif d'ordre n et $a \in G$.

(a) Justifier que l'application $x \mapsto a * x$ est une permutation de G .

(b) En considérant le produit des éléments de G , établir que $a^n = e$.

Exercice 15 [02363] [Correction]

Quel est le plus petit entier n tel qu'il existe un groupe non commutatif de cardinal n ?

Exercice 16 [03292] [Correction]

Soient a et b deux éléments d'ordre respectifs p et q d'un groupe abélien $(G, *)$.

(a) On suppose que p et q sont premiers entre eux.

Montrer que l'élément ab est d'ordre pq .

(b) On ne suppose plus p et q premiers entre eux.

L'élément ab est-il nécessairement d'ordre $\text{ppcm}(p, q)$?

Exercice 17 [04053] [Correction]

Soit (G, \cdot) un groupe abélien fini de neutre e .

(a) Soient x et y deux éléments de G d'ordres finis p et q premiers entre eux. Montrer que l'élément $z = xy$ est d'ordre pq .

(b) On note m le ppcm des ordres des éléments de (G, \cdot) et l'on introduit sa décomposition en facteurs premiers

$$m = p_1^{\alpha_1} \dots p_N^{\alpha_N}.$$

Montrer qu'il existe un élément x_i dans G d'ordre $p_i^{\alpha_i}$ pour chaque $i \in \llbracket 1; N \rrbracket$.

(c) Établir l'existence dans G d'un élément d'ordre m exactement.

Exercice 18 [04151] [Correction]

Dans tout ce sujet n désigne un naturel non nul.

On note $\varphi(n)$ l'indicatrice d'Euler de n , U_n l'ensemble des racines n -ième de l'unité et U_n^* l'ensemble des racines de l'unité d'ordre exactement n . Enfin, pour $d \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\Phi_d = \prod_{z \in U_d^*} (X - z).$$

(a) Écrire en Python la fonction `liste(n)` qui renvoie

$$\{k \in \llbracket 1; n \rrbracket \mid k \wedge n = 1\}.$$

Écrire la fonction `phi(n)` qui renvoie $\varphi(n)$ puis `sumphi(n)` qui renvoie

$$\sum_{d|n} \varphi(d).$$

(b) Montrer

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d.$$

(c) Justifier

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

(d) Montrer que Φ_n est un polynôme à coefficients entiers.

On pose $Q_n = X^n - 1$ et on choisit p, q, r des nombres premiers vérifiant

$$p < q < r < p + q.$$

On pose

$$n = pqr \text{ et } R = \frac{Q_p Q_q Q_r}{X - 1}.$$

(e) Montrer

$$\Phi_n = \frac{Q_n R}{Q_{pq} Q_{qr} Q_{rp}}.$$

(f) Montrer qu'il existe un polynôme S tel que

$$\Phi_n - R = X^{pq} S.$$

(g) En déduire que le coefficient de X^r dans Φ_n est égal à -2 .

Exercice 19 [02649] [Correction]

Soit (G, \cdot) un groupe fini tel que

$$\forall g \in G, g^2 = e$$

où e est le neutre de G . On suppose G non réduit à $\{e\}$.

Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que G est isomorphe à $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, +)$.

Parties génératrices

Exercice 20 [02229] [Correction]

Dans (\mathcal{S}_n, \circ) on considère les permutations

$$\tau = (1 \ 2) \quad \text{et} \quad \sigma = (1 \ 2 \ \dots \ n).$$

(a) Calculer $\sigma^k \circ \tau \circ \sigma^{-k}$ pour $0 \leq k \leq n-2$.

(b) En déduire que tout élément de \mathcal{S}_n peut s'écrire comme un produit de σ et de τ .

Exercice 21 [02368] [Correction]

Soit n un entier naturel non nul, (e_1, \dots, e_n) la base canonique de $E = \mathbb{R}^n$.

Soit \mathcal{S}_n l'ensemble des permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Soit $t_i = (1, i)$.

Pour $s \in \mathcal{S}_n$, on définit $u_s(e_i) = e_{s(i)}$.

(a) Montrer que (t_2, t_3, \dots, t_n) engendre \mathcal{S}_n .

(b) Interpréter géométriquement u_s lorsque s est une transposition.

(c) Soit $s = (1 \ 2 \ \dots \ n-1 \ n)$. On suppose que s est la composée de p transpositions. Montrer que $p \geq n-1$.

(d) Quel est le cardinal minimal d'une famille de transpositions génératrice de \mathcal{S}_n ?

Groupes cycliques

Exercice 22 [03364] [Correction]

Soit x est un élément d'un groupe cyclique de cardinal n . Calculer x^n .

Exercice 23 [00125] [Correction]

Soient H et K deux groupes notés multiplicativement.

(a) Montrer que si h est un élément d'ordre p de H et k un élément d'ordre q de K alors (h, k) est un élément d'ordre $\text{ppcm}(p, q)$ de $H \times K$.

(b) On suppose H et K cycliques. Montrer que le groupe produit $H \times K$ est cyclique si, et seulement si, les ordres de H et K sont premiers entre eux.

Exercice 24 [02365] [Correction]

(Groupe quasi-cyclique de Prüfer) Soit p un nombre premier. On pose

$$G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}.$$

(a) Montrer que G_p est un sous-groupe de (\mathbb{C}^*, \times) .

(b) Montrer que les sous-groupes propres de G_p sont cycliques et qu'aucun d'eux n'est maximal pour l'inclusion.

(c) Montrer que G_p n'est pas engendré par un système fini d'éléments.

Exercice 25 [03444] [Correction]

Soit n un entier ≥ 3 .

(a) Montrer que pour tout entier impair a , on a

$$a^{2^{n-2}} \equiv 1 [2^n].$$

(b) Le groupe $((\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*, \times)$ est-il cyclique?

Exercice 26 [02505] [Correction]

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & \ddots & 1 \\ 1 & (0) & & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

- (a) Calculer le polynôme caractéristique de M . La matrice M est-elle diagonalisable? est-elle inversible?
- (b) Soit $G = \{M^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que G est une groupe cyclique et préciser son cardinal.

Exercice 27 [03715] [Correction]

Soit $(G, *)$ un groupe cyclique à n élément engendré par a .
Pour $r \in \mathbb{N}^*$, on introduit l'application $f: G \rightarrow G$ définie par

$$\forall x \in G, f(x) = x^r.$$

- (a) Vérifier que f est un endomorphisme de $(G, *)$.
- (b) Déterminer le noyau f .
- (c) Montrer que l'image de f est le sous-groupe engendré par a^d avec $d = \text{pgcd}(n, r)$.
- (d) Pour $y \in G$, combien l'équation $x^r = y$ possède-t-elle de solutions?

Exercice 28 [03845] [Correction]

Montrer que les sous-groupes finis du groupe $(\text{SO}(2), \times)$ des rotations du plan sont cycliques.

Exercice 29 [02364] [Correction]

Soit un entier $n \geq 2$. Combien le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ admet-il de sous-groupes?

Groupes isomorphes

Exercice 30 [02650] [Correction]

On note V l'ensemble des matrices à coefficients entiers du type

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{pmatrix}$$

et G l'ensemble des $M \in V$ inversibles dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ et dont l'inverse est dans V .

- (a) Quelle est la structure de G ?
- (b) Soit $M \in V$. Montrer que $M \in G$ si, et seulement si, $\det M = \pm 1$.

- (c) Donner un groupe standard isomorphe à G muni du produit.

Exercice 31 [00122] [Correction]

Les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et (\mathbb{Q}^*, \times) sont-ils isomorphes?

Groupe fini

Exercice 32 [04200] [Correction]

Soit H et K deux sous-groupes d'un groupe fini G noté multiplicativement. On note $HK = \{hk \mid h \in H \text{ et } k \in K\}$. Montrer

$$\text{Card}(HK) \text{Card}(H \cap K) = \text{Card } H \text{Card } K.$$

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on a bien $f(x) \in \mathbb{R}^*$. Pour $x, y \in \mathbb{R}^*$

$$f(xy) = (xy)^n = x^n y^n = f(x)f(y)$$

donc f est un morphisme de (\mathbb{R}^*, \times) vers lui-même.

$\text{Ker } f = f^{-1}(\{1\})$ et $\text{Im } f = \{x^n \mid x \in \mathbb{R}^*\}$.

Si n est pair alors

$$\text{Ker } f = \{1, -1\} \text{ et } \text{Im } f = \mathbb{R}_+^*.$$

Si n est impair alors

$$\text{Ker } f = \{1\} \text{ et } \text{Im } f = \mathbb{R}^*.$$

Exercice 2 : [énoncé]

On sait

$$\forall x, y \in \mathbb{C}, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$$

donc $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un morphisme de groupes.

$$\exp(x) = 1 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2ik\pi$$

donc

$$\text{Ker } \exp = \{2ik\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

La fonction exponentielle complexe prend toutes les valeurs de \mathbb{C}^* donc

$$\text{Im } \exp = \mathbb{C}^*.$$

Exercice 3 : [énoncé]

(a) $f(H) \subset G'$, $e' = f(e) \in f(H)$ car $e \in H$.

Soit $y, y' \in f(H)$, on peut écrire $y = f(x)$ et $y' = f(x')$ avec $x, x' \in H$.

$$y \top y'^{-1} = f(x) \top f(x')^{-1} = f(x) \top f(x'^{-1}) = f(x * x'^{-1})$$

avec $x * x'^{-1} \in H$ donc $y \top y'^{-1} \in f(H)$.

Ainsi $f(H)$ est un sous-groupe de (G', \top) .

(b) $f^{-1}(H') \subset G$ et $e \in f^{-1}(H')$ car $f(e) = e' \in H'$.

Soit $x, x' \in f^{-1}(H')$. On a $f(x), f(x') \in H'$.

$$f(x * x'^{-1}) = f(x) \top f(x')^{-1} = f(x) \top f(x')^{-1} \in H'$$

donc $x * x'^{-1} \in f^{-1}(H')$.

Ainsi $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

Exercice 4 : [énoncé]

$\text{Aut}(G) \subset \mathcal{S}_G$ et $\text{Id}_G \in \text{Aut}(G)$.

Pour tout $f, g \in \text{Aut}(G)$, on a $f \circ g \in \text{Aut}(G)$ et $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ par les propriétés sur les automorphismes.

Ainsi $\text{Aut}(G)$ est un sous-groupe de (\mathcal{S}_G, \circ) .

Exercice 5 : [énoncé]

(a) Soit $x, y, z \in G$,

$$(x \top y) \top z = (x * a * y) * a * z = x * a * (y * a * z) = x \top (y \top z).$$

L'élément $\text{sym}(a)$ est neutre pour la loi \top . En effet, pour $x \in G$, on a

$$x \top \text{sym}(a) = x = \text{sym}(a) \top x.$$

Soit $x \in G$. Posons $y = \text{sym}(a) * \text{sym}(x) * \text{sym}(a) \in G$. On a

$$x \top y = y \top x = \text{sym}(a).$$

(b) $K \subset G$, $\text{sym}(a) = \text{sym}(a) * e$ donc $\text{sym}(a) \in K$.

Soit $\text{sym}(a) * x, \text{sym}(a) * y \in K$. On a

$$(\text{sym}(a) * x) \top (\text{sym}(a) * y)^{\top(-1)} = \text{sym}(a) * x * a * \text{sym}(a) * \text{sym}(y) * a * \text{sym}(a) = \text{sym}(a) * (x * y)$$

(c) Pour $x, y \in G$,

$$f(x * y) = x * y * \text{sym}(a) = (x * \text{sym}(a)) \top (y * \text{sym}(a)) = f(x) \top f(y)$$

f est un morphisme de groupe et il est bijectif d'application réciproque

$g: x \mapsto x * a$.

Exercice 6 : [énoncé]

Soient φ un tel morphisme et τ la transposition qui échange 1 et 2. On a $\tau^2 = \text{Id}$ donc $\varphi(\tau)^2 = 1$ d'où $\varphi(\tau) = 1$ ou -1 . Soit $\tau' = \begin{pmatrix} i & j \end{pmatrix}$ une transposition quelconque de \mathcal{S}_n . Il existe une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ telle que $\tau' = \sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}$ et alors $\varphi(\tau') = \varphi(\tau)$. Sachant enfin que tout élément de \mathcal{S}_n est produit de transpositions on peut conclure :

Si $\varphi(\tau) = 1$ alors $\varphi: \sigma \mapsto 1$. Si $\varphi(\tau) = -1$ alors $\varphi = \varepsilon$ (morphisme signature).

Exercice 7 : [énoncé]

Non, $\{(x, x) \mid x \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}^2, +)$ mais n'est pas produit de deux sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$!

Exercice 8 : [énoncé]

Si $H \subset K$ ou $K \subset H$ alors $H \cup K = K$ (resp. H) et donc $H \cup K$ est un sous-groupe de $(G, *)$

Inversement, supposons que $H \cup K$ est un sous groupe et que $H \not\subset K$. Il existe alors $h \in H$ tel que $h \notin K$.

Pour tout $k \in K$, on a $k * h \in H \cup K$ car $H \cup K$ est stable.

Si $k * h \in K$ alors $h = k^{-1} * (k * h) \in K$ ce qui est exclu.

Il reste $k * h \in H$ qui donne $k = (k * h) * h^{-1} \in H$. Ainsi $K \subset H$.

Ainsi si $H \cup K$ est un sous-groupe alors $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Exercice 9 : [énoncé]

(a) Soit $\varphi: G \rightarrow G'$ un tel morphisme et $H = \{x \in G \mid \varphi(x) = e_{G'}\}$ son noyau.

On sait déjà que H est un sous-groupe de (G, \cdot) .

Soient $x \in H$ et $a \in G$. On a

$$\varphi(axa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(x)\varphi(a)^{-1} = \varphi(a)e_{G'}\varphi(a)^{-1} = e_{G'}$$

donc $axa^{-1} \in H$.

(b) $HK \subset G$ et $e = e.e \in HK$.

Soient $a, b \in HK$. On peut écrire

$$a = xy \text{ et } b = x'y' \text{ avec } x, x' \in H \text{ et } y, y' \in K.$$

On a alors

$$ab = xyx'y'.$$

Puisque $z = yx'y^{-1} \in H$, on a encore

$$ab = (xz)(yy') \in HK.$$

Aussi

$$a^{-1} = y^{-1}x^{-1} = zy^{-1} \in HK$$

avec $z = y^{-1}x^{-1}y \in H$.

Ainsi HK est bien un sous-groupe de (G, \cdot) .

Exercice 10 : [énoncé]

Notons

$$H = \{x + y\sqrt{3} \mid x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}.$$

Pour $a \in H$, $a = x + y\sqrt{3}$ avec $x \in \mathbb{N}$, $y \in \mathbb{Z}$ et $x^2 - 3y^2 = 1$. On a donc $x = \sqrt{1 + 3y^2} > \sqrt{3}|y|$ puis $a > 0$. Ainsi $H \subset \mathbb{R}_+^*$.

$1 \in H$ car on peut écrire $1 = 1 + 0\sqrt{3}$ avec $1^2 - 3 \cdot 0^2 = 1$.

Pour $a \in H$, on a avec des notations immédiates,

$$\frac{1}{a} = x - y\sqrt{3}$$

avec $x \in \mathbb{N}$, $-y \in \mathbb{Z}$ et $x^2 - 3(-y)^2 = 1$. Ainsi $1/a \in H$.

Pour $a, b \in H$ et avec des notations immédiates,

$$ab = xx' + 3yy' + (xy' + x'y)\sqrt{3}$$

avec $xx' + 3yy' \in \mathbb{Z}$, $xy' + x'y \in \mathbb{Z}$ et $(xx' + 3yy')^2 - 3(xy' + x'y)^2 = 1$.

Enfin puisque $x > \sqrt{3}|y|$ et $x' > \sqrt{3}|y'|$, on a $xx' + 3yy' \geq 0$ et finalement $ab \in H$.

Exercice 11 : [énoncé]

Supposons $AH = H$.

$$\forall a \in A, a = ae \in AH = H$$

donc $A \subset H$.

Supposons $A \subset H$. Pour $x \in AH$, $x = ah$ avec $a \in A$, $h \in H$. Or $a, h \in H$ donc $x = ah \in H$.

Ainsi $AH \subset H$.

Inversement, pour $a \in A$ (il en existe car $A \neq \emptyset$) et pour tout $h \in H$, $h = a(a^{-1}h)$ avec $a^{-1}h \in H$ donc $h \in AH$. Ainsi $H \subset AH$ puis =.

Exercice 12 : [énoncé]

(a) Soit H un tel groupe. Nécessairement $H \neq \{0\}$ ce qui permet d'introduire

$$a = \inf\{h > 0 \mid h \in H\}.$$

Si $a \neq 0$, on montre que $a \in H$ puis par division euclidienne que tout $x \in H$ est multiple de a . Ainsi $H = a\mathbb{Z}$ ce qui est exclu. Il reste $a = 0$ et alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha \in H \cap]0; \varepsilon]$. On a alors $\alpha\mathbb{Z} \subset H$ et donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $h \in \alpha\mathbb{Z} \subset H$ vérifiant $|x - h| \leq \alpha \leq \varepsilon$. Ainsi H est dense dans \mathbb{R} .

(b) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Pour $N \in \mathbb{N}^*$, considérons l'application

$$f: \{0, \dots, N\} \rightarrow [0; 1[$$

définie par $f(k) = kx - [kx]$. Puisque les $N + 1$ valeurs prises par f sont dans les N intervalles $[i/N; (i + 1)/N[$ (avec $i \in \{0, \dots, N - 1\}$), il existe au moins deux valeurs prises dans le même intervalle. Ainsi, il existe $k < k' \in \{0, \dots, N\}$ tel que

$$|f(k') - f(k)| < \frac{1}{N}$$

. En posant $p = [k'x] - [kx] \in \mathbb{Z}$ et $q = k' - k \in \{1, \dots, N\}$, on a $|qx - p| < 1/N$ et donc

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Nq} < \frac{1}{q^2}.$$

En faisant varier N , on peut construire des couples (p, q) distincts et donc affirmer qu'il existe une infinité de couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ vérifiant

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

(c) Puisque π est irrationnel, il existe une suite de rationnels p_n/q_n vérifiant

$$\left| \pi - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n^2}$$

avec $q_n \rightarrow +\infty$.

On a alors

$$|u_{p_n}| = \left| \frac{1}{p_n \sin p_n} \right| = \left| \frac{1}{p_n \sin(p_n - q_n \pi)} \right| \geq \frac{1}{|p_n|} \frac{1}{|p_n - q_n \pi|} \geq \frac{q_n}{p_n} \rightarrow \frac{1}{\pi}.$$

Ainsi la suite (u_n) ne tend pas vers 0.

$$\{|\sin n| \mid n \in \mathbb{N}\} = \left\{ |\sin(n + 2k\pi)| \mid n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z} \right\} = |\sin(\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z})|.$$

Puisque le sous-groupe $H = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$, n'est pas monogène (car π irrationnel), H est dense dans \mathbb{R} et par l'application $|\sin(\cdot)|$ qui est une surjection continue de \mathbb{R} sur $[0; 1]$, on peut affirmer que $\{|\sin n| \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0; 1]$.

En particulier, il existe une infinité de n tel que $|\sin n| \geq 1/2$ et pour ceux-ci $|u_n| \leq 2/n$.

Ainsi, il existe une suite extraite de (u_n) convergeant vers 0.

Au final, la suite (u_n) diverge.

Exercice 13 : [énoncé]

- (a) La relation est immédiatement réflexive et symétrique. En discutant selon les cas d'égalité, on montre aussi qu'elle est transitive.
- (b) S'il n'existe pas dans (G, \cdot) d'élément d'ordre 2, les classes d'équivalence de la relation \mathcal{R} comportent toutes deux éléments sauf celle de e qui ne comporte qu'un élément. Les classes d'équivalence étant disjointes de réunion G , le cardinal de G est alors impair ce qui est contraire aux hypothèses.

Exercice 14 : [énoncé]

- (a) Puisque a est inversible, a est régulier ce qui fournit l'injectivité de l'application $x \mapsto a * x$. Un argument de cardinalité finie donne la bijectivité de l'application.
- (b) Par permutation

$$\prod_{x \in G} x = \prod_{x \in G} (a * x) = a^n * \prod_{x \in G} x$$

donc $a^n = e$.

Exercice 15 : [énoncé]

Notons, pour $n = 6$ que (\mathcal{S}_3, \circ) est un groupe non commutatif à 6 éléments. Un groupe à $n = 1$ élément est évidemment commutatif.

Pour $n = 2, 3$ ou 5 , les éléments d'un groupe à n éléments vérifient $x^n = e$. Puisque n est premier, un élément autre que e de ce groupe est un élément d'ordre n et le groupe est donc cyclique donc commutatif.

Pour $n = 4$, s'il y a un élément d'ordre 4 dans le groupe, celui-ci est cyclique. Sinon, tous les éléments du groupe vérifient $x^2 = e$. Il est alors classique de justifier que le groupe est commutatif.

Exercice 16 : [énoncé]

- (a) On a évidemment

$$(ab)^{pq} = (a^p)^q (b^q)^p = e.$$

Inversement, supposons $(ab)^r = e$. On a alors

$$a^{qr} = (a^r)^q = (b^{-r})^q = (b^q)^{-r} = e$$

et donc p divise qr . Or p et q sont premiers entre eux donc p divise r . Mutatis mutandis, on obtient que q divise r et donc pq divise r car p et q sont premiers entre eux.

Finalement ab est un élément d'ordre pq exactement.

(b) Dans (\mathbb{C}^*, \times) , $a = -1$ est d'ordre 2 et $b = -j$ est d'ordre 6 tandis que $ab = j$ est d'ordre 3.

Plus simplement encore, si x est d'ordre n alors $x \times x^{-1}$ est d'ordre 1.

Exercice 17 : [énoncé]

(a) Puisque G est abélien

$$z^{pq} = x^{pq}y^{pq} = (x^p)^q(y^q)^p = e.$$

De plus, pour $k \in \mathbb{N}$, si $z^k = e$ alors $z^{kp} = e$ donc $y^{kp} = e$ ce qui entraîne que q divise kp . Or p et q sont premiers entre eux donc q divise k . De même, on obtient que p divise k . À nouveau puisque p et q sont premiers entre eux, on conclut que pq divise k . L'ordre de z est donc exactement pq .

(b) Puisque $p_i^{\alpha_i}$ est facteur du ppcm des ordres des éléments de (G, \cdot) , il existe un élément x dans G d'ordre $p_i^{\alpha_i}d$ pour un certain $d \in \mathbb{N}^*$. L'élément $x_i = x^d$ est alors d'ordre exactement $p_i^{\alpha_i}$.

(c) Une petite récurrence et l'élément $y = x_1 \dots x_m$ fait l'affaire.

Exercice 18 : [énoncé]

(a) On commence par définir une fonction calculant le pgcd de deux entiers

```
def gcd(a,b):
    if a % b == 0: return b
    else: return gcd(b, a % b)
def liste(n):
    L = []
    for k in range(1,n):
        if gcd(n,k) == 1: L.append(k)
    return L
def phi(n):
    return len(liste(n))
def sumphi(n):
    return sum(liste(n))
```

(b) U_n est un groupe à n . Les éléments de ce groupe ont un ordre divisant n et pour tout d divisant n , les éléments du groupe U_n d'ordre d sont exactement ceux de U_d^* . On en déduit que U_n est la réunion disjointe des U_d^* pour d parcourant les diviseurs de n . On en déduit

$$X^n - 1 = \prod_{z \in U_d} (X - z) = \prod_{d|n} \Phi_d.$$

(c) Le polynôme Φ_n est de degré $\varphi(n)$ car les racines de l'unité d'ordre n sont les

$$e^{2ik\pi/n} \text{ avec } k \in \llbracket 1; n \rrbracket, k \wedge n = 1.$$

L'identité précédente donne la relation voulue en passant celle-ci au degré.

(d) Par récurrence forte sur l'entier $n \geq 1$.

La propriété est immédiate quand $n = 1$. Supposons la propriété vérifiée jusqu'au rang $n - 1$.

On a

$$X^n - 1 = \prod_{d|n, d \neq n} \Phi_d \times \Phi_n.$$

Le polynôme $X^n - 1$ est à coefficients entiers et $\prod_{d|n, d \neq n}$ l'est aussi. De plus, le coefficient dominant de ce dernier vaut 1. On réalisant une division euclidienne, le calcul de Φ_n détermine un polynôme à coefficients entiers.

(e) Les diviseurs de n sont $1, p, q, r, pq, qr, rp$ et n donc

$$Q_n = (X - 1)\Phi_p\Phi_q\Phi_r\Phi_{pq}\Phi_{qr}\Phi_{rp}\Phi_n.$$

De même

$$Q_{pq} = (X - 1)\Phi_p\Phi_q\Phi_{pq}, \text{ etc.}$$

La relation demandée s'en déduit.

(f) Par ce qui précède, on peut écrire

$$(\Phi_n - R)Q_{pq}Q_{qr}Q_{rp} = R(Q_n - Q_{pq}Q_{qr}Q_{rp})$$

0 n'est pas racine de $Q_{pq}Q_{qr}Q_{rp}$, ni de R , mais

$$Q_n - Q_{pq}Q_{qr}Q_{rp} = X^{pq} + \dots$$

On en déduit que 0 est racine de multiplicité pq de $\Phi_n - R$.

(g) Puisque $r < pq$, le coefficient de X^r dans Φ_n est celui de X^r dans P . Or

$$\begin{aligned} P &= (X^p - 1)(X^q - 1)(1 + X + \dots + X^{r-1}) \\ &= (1 - X^p - X^q + X^{p+q})(1 + X + \dots + X^{r-1}). \end{aligned}$$

Le coefficient de X^r dans ce polynôme est -2 car $p + q > r$.

Exercice 19 : [énoncé]

Le groupe (G, \cdot) est abélien. En effet, pour tout $x \in G$, on a $x^{-1} = x$ donc, pour $x, y \in G$, $(xy)^{-1} = xy$. Or $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$ donc $xy = yx$.

Pour $\bar{0}, \bar{1} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $x \in G$, posons

$$\bar{0}.x = e \text{ et } \bar{1}.x = x.$$

On vérifie qu'on définit alors un produit extérieur sur G munissant le groupe abélien (G, \cdot) d'une structure de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -espace vectoriel. En effet, pour $(x, y) \in G^2$ et $(\lambda, \mu) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ on a

$$(\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x, \lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y, \lambda.(\mu.x) = (\lambda\mu).x \text{ et } \bar{1}.x = x.$$

De plus, cet espace est de dimension finie car $\text{Card } G < +\infty$, il est donc isomorphe à l'espace $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, +, \cdot)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. En particulier, le groupe (G, \cdot) est isomorphe à $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, +)$.

Exercice 20 : [énoncé]

- (a) $\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\sigma^2 \circ \tau \circ \sigma^{-2} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$, ... $\sigma^k \circ \tau \circ \sigma^{-k} = \begin{pmatrix} k+1 & k+2 \end{pmatrix}$.
 (b) Il est « connu » que toute permutation de \mathcal{S}_n peut s'écrire comme produit de transpositions de la forme $\begin{pmatrix} k & k+1 \end{pmatrix}$. Ces dernières peuvent s'écrire comme produit de σ , de τ , et de σ^{-1} . Or $\sigma^n = \text{Id}$ et donc $\sigma^{-1} = \sigma^{n-1}$ et par conséquent, σ^{-1} peut s'écrire comme produit de σ .

Exercice 21 : [énoncé]

- (a) Pour $i \neq j \in \{2, \dots, n\}$,

$$(i, j) = (1, i) \circ (1, j) \circ (1, i).$$

Toute transposition appartient à $\langle t_2, t_3, \dots, t_n \rangle$ et puisque celles-ci engendrent S_n ,

$$S_n = \langle t_2, t_3, \dots, t_n \rangle.$$

- (b) Si $s = (i, j)$, u_s est la réflexion par rapport à l'hyperplan de vecteur normal $e_i - e_j$.
 (c) Si s est le produit de p transpositions alors $\text{Ker}(u_s - \text{Id}_E)$ contient l'intersection de p hyperplans (ceux correspondant aux transpositions comme décrit ci-dessus). Or, ici $\text{Ker}(u_s - \text{Id}_E) = \text{Vect}(e_1 + \dots + e_n)$ et donc $p \geq n - 1$.
 (d) $n - 1$ en conséquence de ce qui précède.

Exercice 22 : [énoncé]

Soit a un générateur du groupe cyclique $(G, *)$ introduit dans l'énoncé.

On sait

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\} \text{ avec } a^n = e.$$

Puisque x est élément de G , il existe $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ tel que $x = a^k$ et alors

$$x^n = a^{kn} = e.$$

Exercice 23 : [énoncé]

- (a) $(h, k)^n = 1_{H \times K} \iff p \mid n$ et $q \mid n$ donc (h, k) est un élément d'ordre $\text{ppcm}(p, q)$.
 (b) Posons p et q les ordres de H et K .
 Supposons p et q premiers entre eux.
 Si h et k sont générateurs de H et K alors (h, k) est un élément d'ordre $\text{ppcm}(p, q) = pq$ de $H \times K$.
 Or $\text{Card } H \times K = pq$ donc $H \times K$ est cyclique.
 Inversement, supposons $H \times K$ cyclique.
 Si (h, k) est générateur de $H \times K$ alors h et k sont respectivement générateurs de H et K .
 On en déduit que h est un élément d'ordre p , k d'ordre q et puisque (h, k) est d'ordre $\text{ppcm}(p, q)$ et pq , on conclut que p et q sont premiers entre eux.

Exercice 24 : [énoncé]

- (a) $G_p \subset \mathbb{C}^*$, $1 \in G_p$, pour $z \in G_p$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $z^{p^k} = 1$ et alors $(1/z)^{p^k} = 1$ donc $1/z \in G_p$.
 Si de plus $z' \in G_p$, il existe $k' \in \mathbb{N}$ vérifiant $z'^{p^{k'}} = 1$ et alors $(zz')^{p^{k+k'}} = (z^{p^k})^{p^{k'}} (z'^{p^{k'}})^{p^k} = 1$ donc $zz' \in G_p$.
 (b) Notons

$$U_{p^k} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^{p^k} = 1\}.$$

Soit H un sous-groupe de G_p différent de G_p .

S'il existe une infinité de $k \in \mathbb{N}$ vérifiant $U_{p^k} \subset H$ alors $H = G_p$ car G_p est la réunion croissante de U_{p^k} .

Ceci étant exclu, on peut introduire le plus grand $k \in \mathbb{N}$ vérifiant $U_{p^k} \subset H$.

Pour $\ell > k$, tous les éléments de $U_{p^\ell} \setminus U_{p^k}$ engendrent au moins $U_{p^{k+1}}$, or

$U_{p^{k+1}} \not\subset H$ donc $H \subset U_{p^k}$ puis $H = U_{p^k}$

H est donc un sous-groupe cyclique et ne peut être maximal pour l'inclusion car inclus dans le sous-groupe propre $U_{p^{k+1}}$.

- (c) Si G_p pouvait être engendré par un système fini d'éléments, il existerait $k \in \mathbb{N}$ tel que ses éléments sont tous racines p^k -ième de l'unité et alors $G_p \subset U_{p^k}$ ce qui est absurde.

Exercice 25 : [énoncé]

- (a) Par la factorisation $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$$a^{2^{n-2}} - 1 = (a^{2^{n-3}} + 1)(a^{2^{n-3}} - 1)$$

et en répétant l'opération

$$a^{2^{n-2}} - 1 = (a^{2^{n-3}} + 1)(a^{2^{n-4}} + 1) \dots (a^{2^0} + 1)(a^{2^0} - 1).$$

Il y a $n - 1$ facteurs dans ce produit et ceux-ci sont tous pairs car a est impair. De plus, les deux derniers facteurs sont $a + 1$ et $a - 1$ et parmi ces deux figure un multiple de 4.

On en déduit que 2^n divise $a^{2^{n-2}} - 1$ et donc $a^{2^{n-2}} \equiv 1 [2^n]$.

- (b) Par l'absurde supposons $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$ cyclique. Les éléments de ce groupe sont les \bar{k} avec $2 \nmid k = 1$, ce sont donc les classes des entiers impairs. Il y en a exactement 2^{n-1} . Si \bar{a} est un générateur de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$ alors a est un entier impair et \bar{a} est un élément d'ordre 2^{n-1} . Or le résultat précédent donne $\bar{a}^{2^{n-2}} = \bar{1}$ et donc l'ordre de a est inférieur à $2^{n-2} < 2^{n-1}$. C'est absurde.

Exercice 26 : [énoncé]

- (a) On obtient $\chi_M(X) = (-1)^n(X^n - 1)$. Les racines de χ_M sont les racines de l'unité, il y en a n ce qui est la taille de la matrice et donc M est diagonalisable. Puisque 0 n'est pas racine de χ_M , la matrice M est inversible.
- (b) Par Cayley-Hamilton, nous savons $M^n = I_n$ et donc M est un élément d'ordre fini du groupe $(\text{GL}_n(\mathbb{C}), \times)$. Par calcul ou par considération de polynôme minimal, on peut affirmer que n est le plus petit exposant $p > 0$ tel que $M^p = I_n$ et donc M est un élément d'ordre exactement n . On en déduit que G est un groupe cyclique de cardinal n .

Exercice 27 : [énoncé]

- (a) Le groupe $(G, *)$ est nécessairement commutatif car cyclique. Pour tout $x, y \in G$, on a

$$f(x * y) = (x * y)^r = x^r * y^r = f(x) * f(y).$$

- (b) Pour $x \in G$, on peut écrire $x = a^k$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et alors

$$f(x) = e \iff a^{kr} = e.$$

Puisque a est d'ordre n

$$f(x) = e \iff n \mid kr.$$

En introduisant $d = \text{pgcd}(n, r)$, on peut écrire $n = dn'$ et $r = dr'$ avec $n' \wedge r' = 1$ et alors le théorème de Gauss donne

$$n \mid kr \iff n' \mid k.$$

Par conséquent

$$\text{Ker } f = \langle a^{n'} \rangle.$$

- (c) Par l'égalité de Bézout, on peut écrire $nu + rv = d$ et alors

$$a^d = a^{nu} * a^{rv} = a^{rv} = f(a^v) \in \text{Im } f.$$

Puisque $\text{Im } f$ est un sous-groupe, on a déjà $\langle a^d \rangle \subset \text{Im } f$.

Inversement, soit $y \in \text{Im } f$. On peut écrire $y = x^r$ avec x de la forme a^k où $k \in \mathbb{Z}$. On a donc

$$y = a^{kr}.$$

Or $d \mid r$ et donc $y \in \langle a^d \rangle$. Ainsi $\text{Im } f \subset \langle a^d \rangle$ puis l'égalité.

- (d) Si $y \notin \text{Im } f$, l'équation n'a pas de solution. Sinon, il existe $x_0 \in G$ tel que $x_0^r = y$ et alors

$$x^r = y \iff (x * x_0^{-1})^r = e.$$

Ceci permet de mettre en correspondance bijective les solutions de l'équation $x^r = y$ avec les éléments du noyau de f . Dans ce cas, il y a exactement $n/n' = d$ solutions à l'équation.

Exercice 28 : [énoncé]

Commençons par rappeler que les éléments de $\text{SO}(2)$ sont les matrices

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Soit G un sous-groupe fini de $(SO(2), \times)$.
L'ensemble $T = \{\theta > 0 \mid R(\theta) \in G\}$ est une partie non vide (car 2π en est élément) et minorée de \mathbb{R} . On peut donc introduire

$$\theta_0 = \inf T \in \mathbb{R}_+.$$

Commençons par établir que θ_0 est élément de T .
On peut construire une suite $(\theta_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de T convergeant vers θ_0 .
Puisque l'ensemble G est fini, l'ensemble des $R(\theta_n)$ est lui aussi fini. Il existe donc une infinité d'indices n pour lesquels les θ_n sont égaux modulo 2π à une valeur α .
Puisque $\theta_n \rightarrow \theta_0$, il y a une infinité de θ_n égaux à θ_0 et donc $\theta_0 \in T$.
Puisque $R(\theta_0) \in G$, on a $\langle R(\theta_0) \rangle \subset G$.
Inversement, soit R un élément de G . Il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $R = R(\theta)$. On peut écrire $\theta = q\theta_0 + \theta'$ avec $q \in \mathbb{Z}$ et $\theta' \in [0; 2\pi[$. On a alors

$$R(\theta') = R(\theta)R(\theta_0)^{-q} \in G.$$

Si $\theta' > 0$ alors $\theta' \in T$ ce qui contredit la définition de $\theta_0 = \inf T$ car $\theta' < \theta_0$.
Nécessairement $\theta' = 0$ et donc $\theta = q\theta_0$ ce qui donne $R = R(\theta_0)^q \in \langle R(\theta_0) \rangle$.
Finalement

$$G = \langle R(\theta_0) \rangle.$$

Exercice 29 : [énoncé]

On note \bar{x} la classe d'un entier x dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
On peut introduire

$$a = \min\{k > 0, \bar{k} \in H\}$$

car toute partie non vide de \mathbb{N} possède un plus petit élément.
Considérons alors $\langle \bar{a} \rangle$ le groupe engendré par la classe de a . On peut décrire ce groupe

$$\langle \bar{a} \rangle = \{q\bar{a} \mid q \in \mathbb{Z}\}.$$

C'est le plus petit sous-groupe contenant l'élément \bar{a} car il est inclus dans tout sous-groupe contenant cet élément. Par conséquent $\langle \bar{a} \rangle$ est inclus dans H .
Montrons qu'il y a en fait égalité.
Soit $\bar{k} \in H$. Par division euclidienne de k par a , on écrit

$$k = aq + r \text{ avec } r \in \{0, \dots, a - 1\}.$$

On a alors $\bar{k} = q\bar{a} + \bar{r}$ et donc, par opérations dans le groupe H , on obtient $\bar{r} = \bar{k} - q\bar{a} \in H$. On ne peut alors avoir $r > 0$ car cela contredirait la définition de a . Il reste donc $r = 0$ et par conséquent $\bar{k} = q\bar{a} \in \langle \bar{a} \rangle$

Finalement

$$H = \langle \bar{a} \rangle.$$

De plus, en appliquant le raisonnement précédent avec $k = n$ (ce qui est possible car $\bar{n} = \bar{0} \in H$), on obtient que a est un diviseur de n .
Inversement, considérons un diviseur a de n . On peut écrire

$$n = aq \text{ avec } q \in \mathbb{N}^*$$

et on peut alors décrire les éléments du groupe engendré par \bar{a} , ce sont

$$\bar{0}, \bar{a}, 2\bar{a}, \dots, (q-1)\bar{a}.$$

On constate alors que les diviseurs de n déterminent des sous-groupes deux à deux distincts de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
On peut conclure qu'il y a autant de sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ que de diviseurs positifs de n .

Exercice 30 : [énoncé]

- (a) $G \subset GL_4(\mathbb{R})$, G est non vide, stable par passage à l'inverse et par produit car V l'est. Ainsi G est un sous-groupe de $GL_4(\mathbb{R})$ donc un groupe.
- (b) Si $M \in G$ alors $\det M, \det M^{-1} \in \mathbb{Z}$ et $\det M \times \det M^{-1} = \det I_4 = 1$ donc $\det M = \pm 1$.
Inversement si $\det M = \pm 1$ alors $M^{-1} = \pm^t \text{Com } M$ est à coefficients entiers. On peut remarquer que

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ stable par produit et contenant I_n .
L'application $\varphi: X \mapsto MX$ y définit un endomorphisme injectif donc bijectif.
On en déduit que $M^{-1} = \varphi^{-1}(I_n)$ est élément de E donc de V . Par conséquent, $M \in G$.

- (c) $\det M = ((a+c)^2 - (b+d)^2)((a-c)^2 + (b-d)^2)$

donc

$$\det M = \pm 1 \iff \begin{cases} (a+c)^2 - (b+d)^2 = \pm 1 \\ (a-c)^2 + (b-d)^2 = \pm 1. \end{cases}$$

La résolution de ce système à coefficients entiers donne à l'ordre près :

$$a, b, c, d = \pm 1, 0, 0, 0.$$

Posons J la matrice obtenue pour $a = c = d = 0$ et $b = 1$. On vérifie $J^4 = I_4$.

L'application $\varphi: U_2 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow G$ définie par $\varphi(\varepsilon, n) = \varepsilon J^n$ est bien définie, c'est un morphisme de groupe, injectif et surjectif. Ainsi G est isomorphe à $U_2 \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou plus élégamment à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Exercice 31 : [énoncé]

Non, l'équation $x^2 = 1$ admet deux solutions dans (\mathbb{Q}^*, \times) alors que l'équation analogue dans $(\mathbb{Q}, +)$, à savoir $2x = 0$, n'admet qu'une solution.

Exercice 32 : [énoncé]

Introduisons l'application $f: H \times K \rightarrow G$ définie par $f(h, k) = hk$. L'ensemble HK est exactement l'ensemble des valeurs prises par f .

On étudie l'ensemble des antécédents de chaque valeur prise par f .

Soit y une valeur prise par f sur un certain couple $(h, k) \in H \times K$. Déterminons les autres couples $(h', k') \in H \times K$ envoyés sur y . Si (h', k') est un tel couple, on a $h'k' = hk$ et donc $h^{-1}h' = kk'^{-1}$. Notons a cette valeur. Par opérations, l'élément a est commun aux sous-groupes H et K et permet d'écrire $h' = ha$ et $k' = a^{-1}k$. Inversement, si $h' = ha$ et $k' = a^{-1}k$ avec $a \in H \cap K$, h' et k' sont des éléments de H et K de produit y . L'ensemble des antécédents de y est donc

$$f^{-1}(\{y\}) = \{(ha, a^{-1}k) \mid a \in H \cap K\}.$$

À chaque valeur de a correspond un couple $(ha, a^{-1}k)$ distinct, l'ensemble $f^{-1}(\{y\})$ a donc le cardinal de $H \cap K$.

Résumons, les valeurs de l'application f sont les éléments de $H \times K$ et chacun est une valeur prise $\text{Card}(H \cap K)$ fois. On a donc

$$\text{Card}(HK) \text{Card}(H \cap K) = \text{Card}(H \times K) = \text{Card } H \times \text{Card } K.$$